

Apuntes sobre la Parábola:

Su medición según Arquímedes y otras propiedades

Introducción

Muchas veces habrán oído que Arquímedes fue el precursor del cálculo matemático, afirmación basada en que, hacia el año 240 A.C., obtuvo la medición de cualquier segmento parabólico.

Aunque este resultado marca un hito fundamental en el desarrollo de las matemáticas, la afirmación de que Arquímedes fue “el inventor” del cálculo es un tanto temeraria. Según él mismo, este desarrollo suyo se apoya en lo hecho por “los antiguos griegos”, refiriéndose muy posiblemente a los desarrollos que condujeron a los libros de Euclides, alrededor de 200 años A.C.. Recordemos, por ejemplo, que en estos libros se presenta el método de exhaución para la medición del círculo. Por supuesto, Arquímedes vivía en Sicilia, Italia, lugar en donde la cultura griega era bien conocida¹.

¿Cómo hizo Arquímedes para medir el segmento parabólico, si no disponía de coordenadas cartesianas, y por lo tanto tampoco de funciones “para integrar”? La respuesta es que él tenía un conocimiento profundo de las propiedades de la parábola y, claro, una inteligencia superior.

En estas notas nos proponemos estudiar algunas de las propiedades de la parábola, a partir de su definición, y llegar a la reconstrucción de la medición de un segmento parabólico según Arquímedes. Usaremos las herramientas de las que disponía Arquímedes, es decir no usaremos construcciones basadas en geometría analítica o integrales, sino que usaremos esencialmente la regla y el compás. Terminaremos con otros resultados interesantes, algunos muy sencillos, otros no tanto, y comparando con las herramientas más “nuevas” como geometría analítica y cálculo. En el transcurso iremos dejando preguntas y problemas para el lector inquieto, pero (¡atención remolones!) no son decisivos para la obtención de los resultados principales.

Una manera muy interesante de trabajar con este material es usar software como *Cabri Géométre*, ya que permite mover los “objetos básicos” destacando las propiedades subyacentes en las figuras geométricas. No obstante, las figuras que aquí presentamos están hechas con el software *Mathematica*².

Pero empecemos por el principio . . .

1. La definición clásica de la parábola y su construcción

Una parábola es un objeto geométrico en el plano, definido a partir de un punto llamado *foco*, al que en este artículo normalmente indicaremos por F , y una recta llamada directriz, a la que indicaremos como d . Para definirla necesitamos las nociones de distancia entre dos puntos (en realidad poder comparar la distancia entre pares de puntos), y la distancia de un punto a una recta. Recordemos que la distancia de

¹En realidad, fue un soldado romano quien asesinó a Arquímedes cuando los romanos, luego de un largo sitio, tomaron Siracusa. Por otra parte, es posible que Arquímedes hubiera sido discípulo directo de Euclides.

²El autor agradece a la Olimpiada Matemática Argentina el apoyo brindado, y en particular el uso de las facilidades de computación para el desarrollo de este artículo.

un punto a una recta es la menor distancia del punto a cualquier punto de la recta, y se obtiene tomando la proyección perpendicular del punto sobre la recta.

Ahora sí: dados el foco F y la directriz d , $F \notin d$, la parábola asociada es el lugar geométrico de todos los puntos que están a igual distancia de F y d .

En la Figura 1 vemos el gráfico de una parábola con foco F y directriz d , que de aquí en más indicaremos como (F, d) . Vemos en esa figura a un punto P sobre la parábola y su proyección perpendicular, P' , sobre d . Hemos sombreado con gris oscuro la región que llamaremos “interior” de la parábola, compuesta por los puntos que están más cerca de F que de d , y con gris claro su parte “exterior”, o sea, los puntos que están más cerca de d que de F .

También hemos señalado en la Figura 1 el eje de la parábola, e , que es la recta por F y perpendicular a d , y que constituye un eje de simetría.




Figura 1

Una forma de construir un punto sobre la parábola es considerar que el punto a dibujar se encuentra a una distancia r de F y d . Entonces está en una circunferencia de centro F y radio r , y en una recta paralela a d a distancia r , por lo tanto en la intersección de esa circunferencia y recta. Necesitaremos que r no sea menor que la mitad de la distancia entre F y d para que esa intersección exista, y habrá en general dos puntos en la intersección, señalados por P y Q en la Figura 2.




Figura 2

2. Tangentes a la parábola y otra construcción posible

Podemos hacer una construcción un tanto distinta: si P es un punto sobre la parábola (F, d) y P' es su proyección perpendicular sobre d , entonces la mediatriz del segmento $\overline{FP'}$ pasa por P , pues la mediatriz es el conjunto de puntos que están a igual distancia de F y de P' . Pensándolo al revés, podemos asignar a cada punto P' sobre d un punto P sobre la parábola tomando la intersección de la perpendicular a d por P' y la mediatriz m del segmento $\overline{FP'}$ como se indica en la Figura 3.

A partir de este gráfico parece que la mediatriz m es tangente a la parábola por P . Claro que para ver esto formalmente deberíamos tener una definición de tangente a una curva.




Figura 3

Aunque no es adecuada para cualquier curva, acá nos bastará con tener la idea intuitiva de tangente a una curva como “la recta que interseca la curva y la deja a un lado”. Esta condición es satisfecha por m porque 1) $P \in m$ y 2) m divide al plano en dos semiplanos, uno de los cuales contiene a todos los puntos que están más cerca de P' que de F (como el punto Q en la Figura 3), y entonces todos estos puntos están en el exterior de la parábola, pues la distancia de estos puntos a F es mayor que la distancia a P' que es a su vez mayor o igual que la distancia a d , por lo que ciertamente m “deja a la curva a un lado”. Más concretamente, podríamos decir que el interior de la parábola está completamente contenido en uno de los semiplanos determinados por m , y que *salvo el mismo punto de tangencia, la tangente está completamente contenida en el exterior de la parábola*.

⊕ **Problema 2.1:** Otra forma de definir la tangente a una curva es como “la recta que interseca la curva en un solo punto”. Ver que P es el único punto de m que está en la parábola. ∞

Miremos ahora a la Figura 4, donde hemos denotado por M al punto medio del segmento $\overline{FP'}$ y por F' a la proyección de F sobre d . Por ser M el punto donde la mediatriz m corta al segmento, el ángulo \widehat{PMF} es recto. Claro que M pertenece a la recta r paralela a d que pasa por el punto medio del segmento $\overline{FP'}$. El siguiente problema es una expresión de esta idea. A veces, en vez de trazar las rectas, se ponen hilos, (tal vez de distintos colores) con chinchas, dando por resultado dibujos atractivos.




Figura 4

⊕ **Problema 2.2:** En una mesa se pone un tarugo y se fija una regla bien larga. Se apoya un cateto de una escuadra sobre el tarugo y el vértice recto sobre la regla. Se trazan las rectas dadas por el otro cateto de la escuadra para varias posiciones de la escuadra, resultando una serie de rectas envolventes a una curva. ¿Cuál es esa curva?. (Una envolvente de una familia de rectas es un objeto tal que todo punto de ese objeto pertenece a alguna de las rectas de la familia, y esa recta a la que pertenece es precisamente la tangente al objeto por el punto). ∞

3. Propiedades de la tangente y la normal

En la Figura 5 agregamos el segmento \overline{FP} . Vemos que hay varios ángulos iguales. En efecto, agregando los puntos Q y T para destacar los ángulos, vemos que $\widehat{FPM} = \widehat{P'PM}$, pues P está sobre la mediatriz m del segmento $\overline{FP'}$. También $\widehat{P'PM} = \widehat{TPQ}$, pues son ángulos opuestos por el vértice, por lo que $\widehat{FPM} = \widehat{TPQ}$. Esto nos da la propiedad de reflexión de la parábola: si arrojamamos una pelota (o un rayo de luz) desde F hacia P , la pelota (o rayo) rebotará como si la parábola fuera la tangente m , y se dirigirá hacia Q , es decir, paralela al eje de la parábola. También podemos pensar al revés: si un rayo de luz o pelota viene paralelamente al eje de la parábola por su interior, entonces rebotará en dirección al foco. Como sabemos, esta propiedad de reflexión es usada para la construcción de linternas y antenas satelitales.




Figura 5

⊕ **Problema 3.1:** ¿Qué pasa si el rayo o pelota viene en dirección paralela al eje de la parábola pero desde el exterior?. ¿Y si viene desde el exterior hacia el foco? ∞

⊕ **Problema 3.2:** Los espejos de las linternas tienen la forma de una parábola rotadas sobre su eje y luego truncada. Cuando proyectamos el haz de luz sobre una pared, vemos que se “concentra” si nos acercamos a la pared y se “difunde” si nos alejamos. ¿Cómo puede ser, si los rayos deben reflejarse paralelamente al eje de la parábola, y por lo tanto el haz de luz debería ser un “cilindro”? ∞

La recta normal en el punto P de la parábola, denotada por n en la Figura 6, es la recta por P perpendicular a la tangente a la parábola por P .

En esa figura también hemos agregado otros elementos: el punto S , intersección de n con el eje e ; el punto T , proyección perpendicular de P sobre e ; el punto Q , intersección de la tangente m y e ; así como el punto F' , proyección de F sobre d .

Vemos que \overline{PS} es paralelo a $\overline{P'F}$ (ambos son perpendiculares a m), $\overline{P'P}$ es paralelo a \overline{FS} (ambos son perpendiculares a d), y \overline{PT} es paralelo a $\overline{P'F'}$ (ambos son perpendiculares a e), de lo que podemos obtener varios resultados:




Figura 6

☞ **Resultado 3.3:** Con las notaciones anteriores, la longitud de \overline{ST} es la “distancia característica” de la parábola, es decir, la longitud del segmento $\overline{FF'}$. ➤

Demostración: Basta observar que los triángulos $\triangle P'F'F$ y $\triangle PTS$ son iguales. □

☞ **Resultado 3.4:** Con las notaciones anteriores, el punto medio de \overline{QS} es F . ➤

Demostración: M es el punto medio del segmento \overline{PQ} , pues es punto medio de $\overline{FP'}$ (m es su mediatriz), y siendo $\overline{P'P}$ paralelo a \overline{QF} , los triángulos $\triangle P'PM$ y $\triangle FQM$ son iguales (por una reflexión respecto de M). Entonces \overline{MF} es base media del triángulo $\triangle PQS$, pues es paralelo a \overline{PS} , lo que implica el resultado. □

⊕ **Problema 3.5:** Demostrar que el cuadrilátero $QFPP'$ es un paralelogramo. En particular, $\overline{P'Q}$ y \overline{PF} tienen la misma longitud. ➤

4. Tangente desde un punto exterior

Repasemos: dado un punto P sobre la parábola (F, d) , podemos trazar la tangente tomando la mediatriz m del segmento $\overline{FP'}$ donde P' es la proyección perpendicular de P sobre d .

Nos preguntamos ahora cómo trazar una tangente a la parábola que pase por cualquier punto dado que no esté sobre la parábola. Es claro que el punto dado debe estar en el exterior, pues la tangente nunca tiene puntos interiores.

Supongamos que S es el punto dado, y que ya hemos construido una recta tangente t que toca a la parábola en el punto P que tiene proyección P' sobre d , como en la Figura 7 a).

Entonces, dado que S está en la mediatriz de $\overline{FP'}$, los segmentos \overline{SF} y $\overline{SP'}$ tienen igual longitud, o en otras palabras, P' está en una circunferencia de centro S que pasa por F . En realidad, esta circunferencia corta a la recta d en dos puntos, llamados A' y B' en la Figura 7 b). A partir de estos puntos sobre d es posible construir los puntos A y B sobre la parábola, como en la construcción de la Figura 2. Es decir, cualquier punto exterior a la parábola pertenece exactamente a dos tangentes.




Figura 7 a




Figura 7 b

En realidad, también hemos demostrado:

☞ **Resultado 4.1:** Si A y B son dos puntos de la parábola, cuyas proyecciones sobre d son A' y B' (respectivamente) y las tangentes por A y B se cortan en S , entonces S es el circuncentro del triángulo $\triangle A'B'F$. ➤

⊕ **Problema 4.2:** Sabemos que la intersección de una circunferencia y una recta es o bien dos puntos, o uno, o ninguno. ¿Por qué afirmamos que si el punto S es exterior a la parábola, la circunferencia de centro S que pasa por F corta a d en dos puntos? ¿Cuáles son los puntos S para los cuales esa circunferencia corta a d en exactamente un punto? ¿Y en ninguno? ➤

⊕ **Problema 4.3:** Encontrar el lugar geométrico de los puntos S desde los cuales se ve la parábola a 90° .

Sugerencia: Si S es intersección de las mediatrices de $\overline{A'F}$ y $\overline{B'F}$, el ángulo en S formado por las mediatrices es igual al ángulo $\widehat{A'FB'}$. Además, un triángulo $\triangle A'FB'$ es rectángulo en F si y sólo si $\overline{A'B'}$ es diámetro de la circunferencia circunscrita. Recordar que para demostrar que un objeto es un lugar geométrico de puntos, hay que demostrar *dos* inclusiones). ➤

5. Tangente paralela a una recta dada

Acabamos de ver cómo encontrar una recta (la tangente) dado un punto sobre ella, encontrando la pendiente de esa recta (en el caso anterior había dos posibilidades).

Otra posibilidad es dar la pendiente y encontrar el punto: dada una recta l (que no tiene por qué cortar a la parábola), encontrar una recta t paralela a l y tangente a la parábola (F, d) .

Supongamos que ya hemos encontrado t y el punto de tangencia $T \in t$, que tiene proyección T' sobre d , como en la Figura 8 a). Sabemos que t es la mediatriz del segmento $\overline{FT'}$ y por lo tanto la recta l ha de ser perpendicular a este segmento, en otras palabras, dados (F, d) y l podemos encontrar T' como la intersección de la perpendicular a l que pasa por F . Como ya hemos visto, ahora podemos construir la mediatriz t y después T .

☞ **Problema 5.1:** ¿Qué pasa si la recta l es perpendicular a d ? ☞

Si indicamos con A y B los puntos de intersección de la recta l con la parábola, y con A' y B' las correspondientes proyecciones sobre d , como en la Figura 8 b), mirando con atención observamos que el punto T' parece ser justamente el punto medio de $\overline{A'B'}$.




Figura 8 a




Figura 8 b

Que esto es así siempre es nuestro próximo resultado:

☞ **Resultado 5.2:** Con las notaciones anteriores, el punto T' es el punto medio del segmento $\overline{A'B'}$. ☞

Demostración: Si trazamos dos circunferencias con centros A y B (respectivamente), que pasan por F , ellas son tangentes a d . Si R es la otra intersección de estas circunferencias (una es F), la potencia del punto T' respecto a la circunferencia con centro en A (ver por ejemplo Santaló [2]), es el producto de las longitudes de los segmentos $\overline{T'F}$ y $\overline{T'R}$ e igual al cuadrado de la longitud del segmento $\overline{T'A'}$. Como esa potencia es igual a la potencia de T' respecto a la circunferencia con centro en B , obtenemos que los segmentos $\overline{T'A'}$ y $\overline{T'B'}$ tienen igual longitud. \square

De aquí parece natural plantearse el siguiente:

☞ **Problema 5.3:** Encontrar, con regla y compás, la intersección de una recta l con la parábola (F, d) . (O sea dados los gráficos de las rectas l y d y el punto F , encontrar los puntos A y B de la Figura 8 b)). *Sugerencia:* Encontrar el punto T' , el punto R simétrico de F respecto a l que es el otro punto de intersección de las circunferencias de la Figura 8 b), y la media geométrica de los segmentos $\overline{T'F}$ y $\overline{T'R}$ para determinar A' y B' . ☞

6. El Triángulo de Arquímedes

Consideremos ahora los puntos A y B sobre la parábola, que determinan la recta l . En este caso las tangentes respectivas, que son las mediatrices de los segmentos determinados por F y las proyecciones correspondientes A' y B' se cortan en un punto S . El triángulo $\triangle ABS$, que mostramos sombreado con gris en la Figura 9, es particularmente interesante, y muchas veces se lo llama *triángulo de Arquímedes*.

Sabemos construir un punto T sobre la parábola tal que la tangente correspondiente es paralela a l : T' es la intersección de la perpendicular r a l por F , y la perpendicular a d por T' , que ya sabemos es la mediatriz de $\overline{A'B'}$, contiene al punto T . También ya sabemos que S está en la mediatriz del segmento $\overline{A'B'}$. Más aún: si M es el punto medio de \overline{AB} , entonces por ser $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$ y $\overline{TT'}$ paralelos, M también estará en esta mediatriz. Resumimos estos resultados:

‡ **Resultado 6.1:** Con las notaciones anteriores, los puntos M , S , T y T' están en la mediatriz de $\overline{A'B'}$. >




Figura 9




Figura 10

En la Figura 9, podemos ver que T es aproximadamente el punto medio de \overline{SM} . El próximo resultado dice que esto es siempre así:

‡ **Resultado 6.2:** Con las notaciones anteriores, T es el punto medio del segmento \overline{SM} . >

Demostración: Nos valemos de la Figura 10. Allí hemos construido el punto P , intersección de las tangentes por A y por T (a la que llamamos t). También hemos construido el punto P' , pie de la perpendicular a d por P . Como sabemos, t es paralela a l , y P' es el punto medio del segmento $\overline{A'T'}$. Más aún, como los segmentos $\overline{AA'}$, $\overline{ST'}$ y $\overline{PP'}$ son paralelos, por Tales sabemos que P es el punto medio del segmento \overline{AS} (aún en el caso extremo en que $S = T'$). Otra vez por Tales, ahora mirando al triángulo $\triangle ASM$, podemos ver que T es el punto medio del segmento \overline{SM} . □

También en el transcurso de la demostración hemos visto:

‡ **Resultado 6.3:** Con las notaciones anteriores el punto P , intersección de las tangentes por A y por T , es punto medio del segmento \overline{AS} . >

Puesto que hay tantos puntos medios dando vueltas, podemos relacionar las áreas de varios de los triángulos que aparecen, en particular nos interesa:

‡ **Resultado 6.4:** Con las mismas notaciones, si P y Q son las intersecciones de la tangente por T con las tangentes por A y B respectivamente, entonces

a) $\text{área}(\triangle ABT) = \frac{1}{2} \text{área}(\triangle ABS)$.

b) $\text{área}(\triangle APT) + \text{área}(\triangle BQT) = \frac{1}{2} \text{área}(\triangle ABT) = \frac{1}{4} \text{área}(\triangle ABS)$. >

Demostración: Ilustramos con la Figura 11. Siendo \overline{PQ} paralelo a \overline{AB} , y P el punto medio de \overline{AS} , todo triángulo con “base” \overline{AB} y tercer vértice en \overline{PQ} tiene área igual a la mitad del área de $\triangle ABS$, en particular vale a).

Para b), observamos que

i) $\text{área}(\triangle ABT) = \text{área}(\triangle AMT) + \text{área}(\triangle BMT)$.

ii) \overline{AT} es mediana de $\triangle ASM$, de modo que

$$\text{área}(\triangle AMT) = \text{área}(\triangle AST) = \frac{1}{2} \text{área}(\triangle ARS).$$

iii) \overline{PT} es mediana de $\triangle AST$, de modo que

$$\text{área}(\triangle APT) = \frac{1}{2} \text{área}(\triangle AST).$$

iv) De ii) y iii) obtenemos

$$\text{área}(\triangle APT) = \frac{1}{4} \text{área}(\triangle AMS).$$

v) Análogamente, $\text{área}(\triangle BQT) = \frac{1}{4} \text{área}(\triangle BMS)$.

vi) De i), iv) y v) obtenemos b). □




Figura 11

7. La medición del segmento parabólico según Arquímedes

Siguiendo con las mismas notaciones, dados los puntos A y B en la parábola (F, d) , el *segmento parabólico entre A y B* es el conjunto de puntos en el interior de la parábola limitados por el segmento \overline{AB} , como se indica con gris oscuro en la Figura 12. En esa misma figura, hemos marcado con gris claro el triángulo de Arquímedes $\triangle ABS$, al que ya conocemos.

El resultado de Arquímedes es:

☞ **Resultado 7.1 (Teorema de Arquímedes):** *El área del segmento parabólico entre A y B es exactamente las dos terceras partes el área del triángulo $\triangle ABS$.* ☞




Figura 12

La idea de la demostración es aproximar lo mejor posible el área del segmento parabólico por triángulos que lo vayan encerrando. Por ejemplo, el lector podrá ver el siguiente

☞ **Problema 7.2:** *Demostrar que, con las notaciones de la Figura 11, el triángulo $\triangle ABS$ es el triángulo de menor área que tiene base \overline{AB} y contiene al segmento parabólico entre A y B . De modo similar, el triángulo $\triangle ABT$ es el que tiene mayor área entre los triángulos con base \overline{AB} que están contenidos en el segmento parabólico entre A y B .* ☞

Demostración del Teorema de Arquímedes (7.1): Nos ayudamos con la Figura 13, donde esta vez no incluimos la parábola para poder distinguir los puntos en la figura.

Si s es el área del segmento parabólico, por inclusiones es claro que

$$\text{área}(\triangle ABS) \leq s \leq 2 \text{área}(\triangle ABS)$$

Si quitamos el triángulo $\triangle ABS$ del segmento parabólico, nos quedan dos nuevos segmentos parabólicos: entre A y T , y entre T y B , y repetimos el argumento con estos nuevos segmentos parabólicos.

Para ello añadimos los puntos U y V , que son los puntos de la parábola para los que las tangentes son paralelas, respectivamente, a los segmentos \overline{AT} y \overline{BT} . Obtenemos




Figura 13

$$\text{área}(\triangle ABS) + \text{área}(\triangle AUT) + \text{área}(\triangle BVT) \leq s \leq \text{área}(\triangle ABS) + \text{área}(\triangle APT) + \text{área}(\triangle QBT)$$

expresión que podemos simplificar, usando el resultado anterior, puesto que

$$\text{área}(\triangle AUT) + \text{área}(\triangle BVT) = \frac{1}{2} (\text{área}(\triangle APT) + \text{área}(\triangle QBT)) = \frac{1}{4} \text{área}(\triangle ABS)$$

y

$$\text{área}(\triangle APT) + \text{área}(\triangle QBT) = \frac{1}{2} \text{área}(\triangle ABS)$$

Entonces

$$\left(1 + \frac{1}{4}\right) \text{área}(\triangle ABS) \leq s \leq \left(1 + \frac{1}{2}\right) \text{área}(\triangle ABS)$$

Continuando con este proceso n veces, llegaremos a algo como

$$\left(1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{4^n}\right) \text{área}(\triangle ABS) \leq s \leq \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{4^{n-1}} + \frac{1}{2^n}\right) \text{área}(\triangle ABS)$$

Ahora

$$1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{4^n} = \frac{1 - \frac{1}{4^{n+1}}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^{n+1}}\right)$$

y

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{4^{n-1}} + \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{4^n} + \frac{1}{4^n} = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^{n+1}} \right) + \frac{1}{4^n}$$

Es claro que a medida que n crece, el área buscada s queda determinada por el valor

$$s = \frac{4}{3} \text{área}(\triangle ABT) = \frac{2}{3} \text{área}(\triangle ABS) \quad \square$$

8. Otras propiedades del triángulo de Arquímedes

Siguiendo con las notaciones anteriores, el triángulo de Arquímedes, $\triangle ABS$ en la Figura 14, tiene otras propiedades interesantes. Por ejemplo, los ángulos \widehat{FAS} y \widehat{FSB} coinciden.

Veamos esto: por ser la recta por A y S mediatriz de $\overline{FA'}$, el complementario de \widehat{FAS} es $\widehat{FA'A} = \widehat{AA'F}$. Por otra parte, como $\overline{AA'}$ es perpendicular a d , también $\widehat{FA'B'}$ es complementario de $\widehat{AA'F}$, y por lo tanto $\widehat{FAS} = \widehat{FA'B'}$ pues tienen igual complemento.

Ya sabemos que S es el circuncentro de $\triangle A'B'F$, por lo que de la relación ángulo inscrito y central, $\widehat{FSB'} = 2\widehat{FA'B'}$. Siendo la recta por S y B mediatriz de $\overline{FB'}$, resulta $\widehat{FSB} = \widehat{BSB'} = \widehat{FA'B'}$, por lo que $\widehat{FAS} = \widehat{FA'B'} = \widehat{FSB}$.




Figura 14

☞ **Problema 8.1:** Ver que los triángulos $\triangle FAS$ y $\triangle FSB$ de la Figura 14 son semejantes. En particular, \overline{FS} biseca al ángulo \widehat{AFB} . >

Claro que si C es otro punto de la parábola y T es el punto de intersección de las tangentes por A y C , tendremos $\widehat{FAT} = \widehat{FTC}$ (ver Figura 15). Si ahora R es el punto de intersección de las tangentes por B y C , tendremos

$$\widehat{FSR} = \widehat{FSB} = \widehat{FAS} = \widehat{FAT} = \widehat{FTC} = \widehat{FTR}$$

Entonces, el cuadrilátero $FSTR$ se puede inscribir en una circunferencia, como se indica en la figura, es decir obtenemos:

☞ **Resultado 8.2:** La circunferencia circunscripta al triángulo $\triangle STR$, formado por la intersección de tres tangentes a la parábola, contiene al foco de la parábola. >




Figura 15

9. Más sobre rectas secantes a la parábola

Ya hemos visto cómo construir una tangente con pendiente dada, y hemos visto que la normal y la perpendicular al eje determinan sobre el eje la “distancia característica”. Tomemos ahora dos puntos sobre la parábola, la recta que pasa por ellos y la mediatriz del segmento que los une. Pensando que cuando ambos puntos coinciden la recta se convierte en tangente y la mediatriz en normal, es natural el siguiente resultado:

✎ **Resultado 9.1:** Sean A y B dos puntos sobre la parábola, m y M respectivamente mediatriz y punto medio de \overline{AB} . Sea S la intersección de m con el eje e , y sea T la proyección de M sobre e . Entonces la distancia entre S y T es la distancia característica de la parábola. \asymp

Demostración: Ilustramos con la Figura 16. Sea P el punto de la parábola cuya tangente es paralela a \overline{AB} , R la intersección de la normal por P con e , Q la proyección de P sobre e . Entonces, como sabemos, $\overline{QR} = \overline{FF'}$ = “distancia característica”. El triángulo $\triangle MTS$ es igual a $\triangle PQR$, pues P y M están sobre una paralela a e , y \overline{PR} es paralelo a \overline{MS} (son perpendiculares a la recta por A y B y a la tangente por P). Por lo tanto, los segmentos \overline{TS} , \overline{QR} y $\overline{FF'}$ tienen igual longitud. \square

Ya sabemos que si dos rectas secantes son paralelas, los puntos medios de las cuerdas están sobre una misma perpendicular a la directriz. El resultado anterior nos dice qué pasa cuando los puntos medios de las cuerdas están sobre una misma perpendicular al eje:

✎ **Resultado 9.2:** Sean A, B, C y D cuatro puntos sobre la parábola, m y n mediatrices de \overline{AB} y \overline{CD} , M y N sus puntos medios, respectivamente. Si M y N están sobre una misma perpendicular al eje e , entonces m y n cortan a e en un mismo punto (ver Figura 17). \asymp

Demostración: Es inmediata a partir del resultado anterior. \square

El lector podrá preguntarse cómo hacer para dibujar la Figura 17. La respuesta está en el próximo problema y en que, por un problema anterior, ya sabemos construir la intersección de una recta y una parábola.

⊃ **Problema 9.3:** Sean A y B dos puntos sobre la parábola, m mediatriz de \overline{AB} y M su punto medio. Sea S la intersección de m con el eje e y sea N un punto sobre la perpendicular a e por M que está en el interior de la parábola. Entonces N es punto medio de \overline{CD} , donde C y D están sobre la parábola y la mediatriz de \overline{CD} contiene al segmento \overline{NS} .

Sugerencia: Trazar la recta perpendicular a \overline{NS} por N . Esta recta corta a la parábola en C y D . Si Q es el punto medio de \overline{CD} , ver que $Q = N$ usando el resultado anterior. \asymp




Figura 16




Figura 17

10. Un poco de geometría analítica y cálculo

Si bien estamos jugando a que no vamos a usar coordenadas ni cálculo, es interesante ver desde este punto de vista las construcciones que estamos realizando.

Sabemos que si disponemos de ejes cartesianos, y la directriz d es paralela al eje de las x 's, entonces la parábola puede describirse con la ecuación $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, para constantes a, b y c adecuadas, $a \neq 0$.

Por ejemplo, si los puntos $A = (x_A, y_A)$ y $B = (x_B, y_B)$ están sobre la parábola, entonces el punto medio entre A y B , que hemos llamado M en la Figura 10, tiene por coordenadas $M = (x_M, y_M)$ donde

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2},$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1}{2} a(x_A^2 + x_B^2) + \frac{1}{2}(bx_A + bx_B) + c$$

Más aún, si usamos cálculo, sabemos que la recta tangente a la parábola en el punto (x, y) tiene pendiente dada por la derivada, $y' = f'(x) = 2ax + b$. Por ejemplo, las tangentes por los puntos A y B

tienen ecuaciones:

$$t_A : y - y_A = (2ax_A + b)(x - x_A)$$

$$t_B : y - y_B = (2ax_B + b)(x - x_B)$$

y se cortan en el punto $S = (x_S, y_S)$. Para encontrar estas nuevas coordenadas podemos, por ejemplo, despejar primeramente y_S , obteniendo

$$(2ax_A)(x_S - x_A) + ax_A^2 + bx_A + c = (2ax_B)(x_S - x_B) + ax_B^2 + bx_B + c$$

de donde resulta, con un poco de álgebra, que $x_S = (x_A + x_B)/2$, es decir, $x_S = x_M$, como ya vimos.

También el punto T de la Figura 10 es el previsto por el Teorema de Rolle: dados x_A y x_B , existe ξ entre x_A y x_B tal que

$$f'(\xi) = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A}$$

lo que aquí se traduce en que existe ξ tal que

$$f'(\xi) = 2a\xi + b = \frac{a(x_B^2 - x_A^2) + b(x_B - x_A)}{x_B - x_A} = a(x_B + x_A) + b$$

Despejando, resulta $\xi = (x_A + x_B)/2$. Según nuestras notaciones, ξ es la coordenada x de T , y se deduce que M , S y T tienen todos la misma coordenada x .

⊳ **Problema 10.1:** En base a las ecuaciones anteriores, demostrar que T es el punto medio de M y S . >

⊳ **Problema 10.2:** Sin usar cálculo, encontrar la pendiente de la recta tangente (es decir la derivada) en términos de los coeficientes a , b y c , usando que la tangente a la parábola en un punto es una mediatriz. >

11. Construcción de la parábola a partir de otros elementos

Sigamos con el uso de coordenadas, con la directriz d paralela al eje de las x 's. Si conocemos tres puntos sobre la parábola, podemos encontrar su ecuación y determinarla completamente (en general, para un polinomio de grado n necesitamos $n + 1$ puntos). Tendríamos tres ecuaciones que forman un sistema lineal (de Van der Monde) y tres incógnitas, a , b y c . Estaríamos tentados a decir que la parábola tiene “tres grados de libertad”: los coeficientes a , b y c . Pero nos estaríamos olvidando que tenemos otro dato: d es paralela al eje de las x 's, es decir tenemos además la pendiente de d . Más bien debemos pensar que tenemos “cuatro grados de libertad”: para F necesitamos dos coordenadas, y para d necesitamos también dos, por ejemplo su pendiente y la intersección con el eje de las y 's (hay que tener en cuenta el caso en que d es paralela al eje y , pero ...). Por supuesto que esto de los “grados de libertad” es un tanto ambiguo, pues para los tres puntos de la parábola necesitamos ya seis datos, dos coordenadas por punto.

Sin embargo, siguiendo con la idea de “cuatro grados de libertad”, debemos pensar que conocer un punto de la parábola es un grado, así como conocer la tangente en un punto, y así como conocer la pendiente de d , o que d pasa por cierto punto. En particular, dados 4 puntos de la parábola podemos reconstruirla, es decir, encontrar el foco y directriz (resultado debido a Newton, ver por ejemplo Dörrie [1]).

En este sentido, la parábola es aún más sencilla que un cuadrilátero: con 4 puntos no alcanzamos a determinar el cuadrilátero que lo contiene, salvo que sepamos que son los vértices o que tienen alguna otra particularidad. También podemos relacionar con otras cónicas: para una circunferencia necesitamos 3 grados de libertad: el centro (equivalente al foco en la parábola: dos grados) y el radio (otro grado), pero también podemos obtener la circunferencia a partir de 3 puntos sobre ella. En general, para una cónica necesitamos 5 datos (o grados de libertad), resultado asociado a los nombres de Pascal, Brianchon y Desargues y a la geometría proyectiva. Así, dados 5 puntos sobre una cónica podemos determinarla completamente, pero si sabemos que es una parábola bastan 4 y si sabemos que es una circunferencia bastan 3.

Nuestro propósito en esta sección es presentar algunos de estos problemas, basados en la idea de los “cuatro datos”, dejando algunas indicaciones para el lector impaciente. Por otra parte, el lector inquieto seguramente pensará en otras alternativas.

⊕ **Problema 11.1:** *Construir con regla y compás el foco dados la directriz y dos puntos sobre la parábola.*

Nota: en general hay dos soluciones.

Sugerencia: trazar los pies y circunferencias. >✂

⊕ **Problema 11.2:** *Construir con regla y compás la directriz dados el foco y dos puntos sobre la parábola.*

Nota: hay dos soluciones.

Sugerencia: ¿cómo se traza una tangente exterior a dos circunferencias? >✂

⊕ **Problema 11.3:** *Construir con regla y compás la directriz dados el foco y dos rectas tangentes.*

Nota: no se dan los puntos de tangencia.

Sugerencia: Encontrar simétricos de F respecto a las rectas dadas. >✂

⊕ **Problema 11.4:** *Construir con regla y compás la directriz dados el foco, un punto sobre la parábola y su tangente. Repetir para el caso en que la tangente no pasa por el punto dado.*

Nota: En el primer caso hay una solución, en el otro, dos.

Sugerencia: a) trazar el simétrico de F respecto de la tangente, b) ¿cómo se traza la tangente a una circunferencia que pasa por un punto? >✂

⊕ **Problema 11.5:** *Construir con regla y compás la directriz dados el foco, el eje y un punto sobre la parábola.*

Nota: Observar que en este caso el foco y el eje dan sólo “dos grados de libertad”.

Sugerencia: Trazar una circunferencia con centro F y radio A (el punto dado sobre la parábola), cortando al eje en dos puntos. >✂

⊕ **Problema 11.6:** *Construir con regla y compás la directriz y el foco dados dos puntos de la parábola y sus respectivas tangentes.*

Sugerencia: Usar problemas anteriores y que F es punto medio de las intersecciones de la tangente y la normal por un punto de la parábola con el eje (trazar rectas de “puntos medios”). >✂

⊕ **Problema 11.7:** *Construir con regla y compás la directriz y el foco dados dos puntos sobre la parábola y el eje.*

Nota: Los puntos no deben ser simétricos uno del otro respecto del eje.

Sugerencia: Considerar el punto medio M entre A y B , los puntos de la parábola. Las intersecciones de la mediatriz por M y la perpendicular al eje por M determinan el “distancia característica” de la parábola. Con este parámetro y una perpendicular al eje por A se pueden construir la tangente y la normal por A , y se reduce a un problema anterior. >✂

⊕ **Problema 11.8:** *Construir con regla y compás el foco y la directriz de la parábola, dadas cuatro rectas tangentes.*

Nota: Observar que no se dan los puntos de tangencia, sólo las rectas.

Sugerencia: Usar que triángulos formados por la intersección de tangentes tienen circunferencias circunscritas que pasan por F . >✂

Referencias

- [1] H. DÖRRIE: *100 Great Problems of Elementary Mathematics. Their History and Solution.* Dover, 1965.
- [2] L. A. SANTALÓ: *La Geometría en la Enseñanza de los Profesores.* Editorial Red Olímpica, 1993.